



SINIFI :

NO :

ADI, SOYADI:


Hepinize başarılar dilerim.

Kömür, çok miktarda bitkisel maddenin, havasız bir ortamda ve basınç altında değişmesi sonucunda oluşan bir kayadır.

Buna göre kömür, aşağıdaki kayaç türlerinden hangisine bir örnektir?

- A) İç püskürük B) Dış püskürük
C) Kimyasal tortul D) Organik tortul
E) Kırıntı (mekanik) tortul

(1991 ÖSS)




Yukarıdaki topoğrafya haritasında taralı alandaki alüvyal topraklarda horizonların oluşumunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Eğimin azaldığı yerlerde oluşması
B) Mineral ve organik madde bakımından zengin olması
C) Taban suyunun yüksek olması
D) Kil içeriğinin yüksek olması
E) Akarsuların getirdiği malzemelerle sürekli yenilenmiş olması

(2013 YGS)

Orman üst sınırını sıcaklığın yetersizliği ve yükselti belirler.



Buna göre, haritadaki numaralanmış yerlerin hangisinde orman üst sınırının en yüksek olması beklenir?

- A) I B) II C) III D) IV E) V
(2009 ÖSS – Sos 1)

Yeryüzündeki göl sularının tuzlu, tatlı ya da sodalı olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

- A) Gölün gideğinin olup olmaması
B) Göl çanağının kayaç yapısı
C) Gölün denizden yüksekliği
D) Göle ulaşan akarsuların az ya da bol su taşıması
E) Gölün bulunduğu yerin iklim özellikleri

(2006 ÖSS – Sos 1)

X bölgesinin doğal bitki örtüsü maki, Y bölgesinin doğal bitki örtüsü bozkırdır.

Bu durum, X ve Y bölgelerinin aşağıdakilerin hangisi bakımından farklı olmasına bağlanabilir?

- A) Düzlük alanların oranı
B) Toprak türü
C) Uygulanan tarım yöntemleri
D) Yapılan hayvancılık türü
E) İklim tipi

(2006 ÖSS – Sos 1)


Bir ülkede yer alan X ve Y yörelerinde ormanların bir bölümü yangın nedeniyle tahrip olmuştur. Bu alanlar kendi haline bırakıldığında, X yöresinde orman bir süre sonra kendini yenilemiş, Y yöresinde ise yenileyememiş ve ağaçlandırma yapılması gerekmiştir.

Buna göre, X ve Y yöreleri için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

- A) X yöresinde nem oranı Y yöresinden fazladır.
B) X ve Y yörelerinin enlemleri farklıdır.
C) Y yöresinde akarsu ağı X yöresinden daha sıktır.
D) Y yöresinin ortalama yükseltisi X yöresinden fazladır.
E) X yöresinin yüzölçümü Y yöresinden büyüktür.


(2004 ÖSS)

Yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı geçen yerlerde yetişen, soğuğa dayanıksız bir kültür bitkisi aşağıdaki grafiklerin hangisinde gösterilen iklim tipinde yetiştirilebilir?



(1994 ÖSS)

Aşağıdaki haritada bir doğal bitki örtüsünün coğrafi dağılışı gösterilmiştir.



Bu dağılışa dayanarak, bu bitki ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

- A) Ilıman iklimlerde yetişir.
B) Her mevsim bol yağışa gereksinimi vardır.
C) Kış soğuklarından etkilenmez.
D) Soğuk rüzgârlardan olumsuz yönde etkilenir.
E) Her mevsim bol ışığa gereksinimi vardır.

(1994 ÖSS)

Aşağıdaki toprak türlerinden hangisi Akdeniz iklimi bölgesinde, kalkerli araziler üzerinde yaygın olarak bulunur?


- A) Terra rossa B) Çernezyom
C) Alüvyal topraklar D) Podzol
E) Kahverengi orman toprakları

(1993 ÖYS)

Aşağıdaki durumların hangisinde, bir kaynak suyunun sıcaklığı yıl boyunca pek fazla değişmez?

- A) Yağmur ve kar suları ile besleniyorsa
B) Debisi yıl içinde azalıp çoğalıyorsa
C) Orta enlemlerdeki bir bölgede yer alıyorsa
D) Su, yerin derinliklerinden geliyorsa
E) Taban suyu seviyesi yüksekse

(1990 ÖSS)



Yukarıdaki şekilde, iki bölgedeki bitki kuşaklarının yükseliğe göre dağılışı gösterilmiştir.

I. bölgenin en alt kesiminde bozkırların yer alması aşağıdakilerde hangisinin sonucu olabilir?

- A) Deniz etkisine açık olması
B) Yaz sıcaklıklarının düşük olması
C) Buharlaşmanın az olması
D) Nem oranının düşük olması
E) Termik alçak basınç alanı olması

(1991 ÖYS)

